

DIFESA INTEGRATA DEL CICORINO E RADICCHIO DA TAGLIO

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - Distruggere i residui delle colture ammalate; - ampie rotazioni; - favorire il drenaggio del suolo; - aerare serre e tunnel; - utilizzare varietà resistenti <u>Interventi chimici:</u> - di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per cv sensibili in caso di piogge ripetute.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> COS-OGA Prodotti rameici Laminarina Cerevisane Fosetil-Al Fosfonato di K Metalaxyl-M Dimetomorf Mandipropamid Ametoctradin Oxathiapiprolin Azoxistrobin			(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno (*) Ammesso in coltura protetta (*) Per ciclo colturale (*) Utilizzabile fino al 20/05/2025 (*) Per ciclo colturale (*) Ammesso in pieno campo (*) Ammessi 2 interventi in pieno campo, 1 in coltura protetta.
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	<u>Interventi chimici:</u> Intervenire alla comparsa dei sintomi.	Eugenolo + Geraniolo + Timolo Zolfo Azoxistrobin			Si ricorda che lo zolfo è inefficace a temperature inferiori a 10-15 °C e può risultare fitotossico alle alte temperature.
Alternaria (<i>Alternaria porri</i>) Ruggine (<i>Puccinia cichorii</i> , <i>P. opizii</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - Impiego di seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette <u>Interventi chimici:</u> - In presenza di sintomi	Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
Septoria (<i>Septoria lactucae</i>) Antracnosi (<i>Marssonina panattoniana</i>)	<u>Interventi chimici:</u> - In presenza di sintomi	Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
Rizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive - utilizzare seme sano oppure conciato - evitare ristagni idrici - allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine	(<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>) <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Pseudomonas sp.</i> Azoxistrobin			
Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	<u>Interventi agronomici:</u> - evitare ristagni idrici - effettuare avvicendamenti ampi <u>Interventi chimici:</u> - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Trichoderma harzianum</i> (<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>) (Propamocarb + Fosetyl Al)			(*) Solo in vivaio / semenzaio

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciume basale (<i>Sclerotinia</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i>)	<u>Interventi chimici:</u> Intervenire durante le prime fasi vegetative. <u>Interventi agronomici:</u> - arieggiare le serre e i tunnel; - utilizzare varietà poco suscettibili; - eliminare le piante ammalate.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>			
		<i>Trichoderma harzianum</i>	(*)		(*) Solo contro Sclerotinia
		(<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>)	(*)		(*) Solo contro Sclerotinia
		(<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i>)			(*) Solo contro Sclerotinia
		<i>Trichoderma atroviride</i>	(*)		(*) Solo contro Sclerotinia
		<i>Bacillus subtilis</i>			
		<i>Pythium oligandrum</i>			
		Eugenolo + Geraniolo + Timolo			
		(Cyprodinil + Fludioxonil)		2	
		Fludioxonil			
		Fenexamid	2		
		Azoxistrobin	2*		(*) Solo contro Sclerotinia
Patogni tellurici Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.) Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>) Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	<u>Interventi chimici:</u> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti - ammessi solo in coltura protetta				Interventi da effettuarsi prima della semina. Ammessi solo in coltura protetta
		Metam Na (*)		1*	(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
		Metam K (*)			(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
					(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.
		Dazomet (*)		1*	(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni), - concimazioni azotate e potassiche equilibrate, - eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata; - non irrigare per aspersione e con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici. <u>Interventi chimici:</u> da effettuare dopo operazioni che possono causare ferite alle piante				
		Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
VIROSI (CMV, LeMV)	Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (tra cui il virus del mosaico del cetriolo, CMV) i trattamenti aficidi diretti sulla coltura non sono in grado di prevenire la trasmissione del virus				Nel rispetto delle norme generali relative al diserbo eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi.
FITOFAGI Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon</i> spp., <i>Aphis intybi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>)	<u>Interventi chimici:</u> Intervenire alla comparsa delle infestazioni	Sali potassici di acidi grassi			
		Maltodestrina			
		Azadiractina			
		<i>Beauveria bassiana</i>			
		Piretrine pure		4*	
		Lambdacialotrina	2		(*) Tra Piretrine e Piretroidi
		Acetamiprid	1*		(*) Una applicazione per ciclo colturale
		Spirotetramat	2*		(*) Utilizzabile fino al 30/10/2025
Nottue fogliari (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Autographa gamma</i>)	<u>Interventi chimici:</u> Soglia: presenza di focolai Soglia: presenza di focolai	<i>Bacillus thuringiensis</i>			
		Azadiractina			
		Lambdacialotrina	2**	4*	(**) Ammesso in pieno campo. (*) Tra Piretrine e Piretroidi
		Clorantraniliprole	2*		(*) Ammesso solo contro <i>Heliothis</i>
		Tebufenozide	(*)		(*) Ammesso in pieno campo
		Emamectina	2*		(*) Ammesso in pieno campo
		Metaflumizone			(*) Ammesso su cicorino

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	Interventi chimici:				
	Soglia: Infestazione generalizzata.	Lambdacialotrina	2	4*	(*) Tra Piretrine e Piretroidi
Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi biologici:				
	- lanciare <i>Phytoseiulus persimilis</i> in presenza di 3-4 acari fitofagi per foglie	<i>Phytoseiulus persimilis</i>			
	- realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2 individui per pianta e per lancio	Maltodestrina			
	Soglia:	Sali potassici di acidi grassi			
	In presenza di precoci focolai di infestazione con evidenti aree decolorate delle foglie in assenza di predatori	Terpenoid blend QRD 460			
Tripidi	Interventi chimici	Abamectina	1*		(*) Per ciclo colturale. Ammesso in coltura protetta.
	Intervenire sulle giovani larve				
		Sai potassici di acidi grassi			
		<i>Beauveria bassiana</i>			
		Terpenoid blend QRD 460			
Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	Interventi meccanici:	Lambdacialotrina	2	4*	(*) Tra Piretrine e Piretroidi
	- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi				
	- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti di aleurodidi				
	Interventi fisici:				
	- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti				
	Interventi chimici:				
	- presenza				
Minatori fogliari (<i>Lyriomiza huidobrensis</i>)	Interventi biologici:				
	Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq	<i>Diglyphus isaea</i>			
	Interventi chimici:	Azadiractina			
	- se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizioni	Abamectina	1*		(*) Per ciclo colturale. Ammesso in coltura protetta.
Mosca (<i>Ophionyia pinguis</i>)	Si consiglia di interrare in profondità i residui colturali.				
Lime (<i>Helix spp.</i> , <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax spp.</i> , <i>Agriolimax spp.</i>)	Interventi chimici				Distribuire le esche lungo le fasce interessate
	Trattare alla comparsa	Metaldeide esca			
		Fosfato ferrico			
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp.</i>)	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.				
	Interventi agronomici:	Estratto d'aglio			
	- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1) (1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto, con interrimento a 15-20 cm e bagnatura successiva.	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	(*)		(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha

Regione Emilia-Romagna 2025
(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità