

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME	Interventi agronomici				
Monilia (<i>Monilia</i> spp.)	<div>- all'impianto scegliere appropriati sesti, tenendo conto della vigoria del portinnesto e di ogni singola varietà</div> <div>- successivamente proporzionare adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da evitare una eccessiva vegetazione</div> <div>- curare il drenaggio</div> <div>Interventi di difesa</div> <div>- è opportuno trattare in pre-fioritura</div> <div>- se durante le successive fasi fino alla scamicatura si verificano condizioni climatiche favorevoli all'infezione (elevata umidità e prolungata bagnatura della pianta), si consiglia di ripetere il trattamento</div> <div>- si consiglia di limitare gli interventi in pre-raccolta alle cvs ad elevata suscettibilità o in condizioni climatiche favorevoli all'infezione</div>	<i>Bacillus subtilis</i>			
		<i>Trichoderma atroviride</i>			
		Bicarbonato di potassio			
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>			
		<i>Saccaromyces cerevisiae</i>			
		Al massimo 4 interventi all'anno contro questa avversità, ad esclusione delle sostanze attive sopra riportate			
		Mefentrifluconazolo	2		
		Difenoconazolo		4	
		Tebuconazolo	2		
		(Tebuconazolo +			
		Trifloxystrobin)	2		
		Mandestrobin	2	3	
		(Pyraclostrobin +	3		
		Boscalid)	3		
		Fluopyram	1	4*	(*) Tra Fluopyram, Fluxapyroxad, Penthiopyrad, Boscalid e Isofetamid
		Penthiopyrad	2		
		Isofetamid	2		
		Fenexamid	2	3	
		Fenpirazamine	2		
		Fludioxonil	1		
		Ciprodinil		1	
		Pyrimethanil			
Corineo (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	Interventi agronomici				
		<i>Trichoderma atroviride</i>			
	Interventi chimici	Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
		Captano	3		
Mal bianco (<i>Podosphaera clandestina</i> <i>Sphaeroteca pannosa</i>)	Interventi chimici	Zolfo			
		Bupirimate	2		
		(Tryfloxistrobin +		3*	(*) Tra Pyraclostrobin, Tryfloxistrobin e Mandestrobin
		Tebuconazolo)			
		Tebuconazolo	2	4	
		Difenoconazolo			
		Mefentrifluconazolo	2		
		(Pyraclostrobin +	3	3*	(*) Tra Pyraclostrobin, Tryfloxistrobin e Mandestrobin
		Boscalid)	3		
		Fluopyram	2	4*	(*) Tra Fluopyram, Fluxapyroxad, Penthiopyrad, Boscalid e Isofetamid
Nerume delle drupacee (<i>Cladosporium carpophilum</i>)	Interventi agronomici				La miscela Pyraclostrobin + Boscalid (impiegata nei confronti di monilia) è efficace contro questa avversità
		Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
		Zolfo			
		Pyraclostrobin		3*	(*) Tra Pyraclostrobin, Tryfloxistrobin e Mandestrobin
Maculatura rossa (<i>Apiognomonina erythrostoma</i>)	Il periodo di rischio coincide con il rilascio delle ascospore (tra aprile e maggio)				Gli interventi nei confronti del mal bianco con IBE hanno attività collaterale anche nei confronti di questa avversità
		Mefentrifluconazolo	2	4*	(*) Tra gli IBE

Regione Emilia-Romagna 2025
(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) Numero massimo di interventi per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERIOSI (<i>Xanthomonas pruni</i> <i>Pseudomonas syringae</i>)	Interventi agronomici Durante la potatura individuare, asportare ed eliminare tutti i rametti infetti Soglia presenza di infezioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell'annata Intervenire a ingrossamento gemme	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> Prodotti rameici			
			(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
VIROSI Sharka (Plum pox virus)	Interventi agronomici - impiegare materiale vivaistico certificato - effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi avvisare tempestivamente il Servizio fitosanitario regionale - applicare rigorosamente le prescrizioni previste dagli Ispettori fitosanitari				
FITOFAGI Anarsia (<i>Anarsia lineatella</i>)	Installare le trappole secondo le indicazioni riportate nelle tabelle 21 e 22 della parte generale, entro l'ultima decade di aprile o in base alle indicazioni dei Bollettini tecnici provinciali Soglia trattare al superamento della soglia di 7 catture per trappola a settimana o 10 catture per trappola in 2 settimane Tale soglia non è vincolante per le aziende che: - applicano i metodi della confusione o della distrazione sessuale - utilizzano il <i>Bacillus thuringiensis</i> Il momento preciso per gli interventi è indicato dai Bollettini tecnici provinciali Installare la confusione o la distrazione sessuale all'inizio del volo	Distrazione e Confusione sessuale <i>Bacillus thuringiensis</i> Acetamiprid Etofenprox Spinosad Spinetoram Clorantranilprole Emamectina Tebufenozide			
			1		
			2		
			(*)		(*) Prodotti attivi anche nei confronti delle forficule se eseguiti nelle ore notturne
				3	(*) Utilizzabile fino al 30/12/2025
			1*		
			2		
			2		
			2		
Eulia (<i>Argyrotaenia pulchellana</i> = <i>Argyrotaenia ljugiana</i>)	Soglia I generazione: non sono ammessi interventi II generazione: presenza di larve giovani con danni iniziali sui frutti	<i>Bacillus thuringiensis</i>			
Cocciniglia di San José (<i>Comstockaspis pernicioso</i>) Cocciniglia bianca (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	Soglia Presenza di infestazioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell'annata precedente Intervenire a ingrossamento gemme	Olio minerale Pyriproxifen Spirotetramat			
			1*		(*) Impiegabile entro la fase di pre-fioritura
			2*		(*) Massimo 1 intervento verso questa avversità. Utilizzabile entro il 30/10/2025
Cocciniglia asiatica (<i>Pseudococcus comstocki</i>)	Effettuare lanci con insetti utili se ci sono stati danni alla raccolta nell'anno precedente o se si è osservata la presenza dell'insetto sulle piante a partire dalla metà del mese di aprile	<i>Anagyrus pseudococci</i> <i>Cryptolaemus montrouzieri</i> Spirotetramat			
			2*		(*) Massimo 1 intervento verso questa avversità. Utilizzabile entro il 30/10/2025
FITOFAGI OCCASIONALI Cocciniglia del corniolo (<i>Parthenolecanium corni</i>)	Soglia Intervenire nel caso di infestazione rilevata nell'anno precedente	Olio minerale			
Pandemis e Archips (<i>Pandemis cerasana</i>) (<i>Archips podanus</i>)	Interventi di difesa Soglia 5% di germogli infestati	<i>Bacillus thuringiensis</i>			
Tignola delle gemme (<i>Recurvaria nanella</i>) Cheimatobia o Falena (<i>Operophtera brumata</i>) Archips rosana (<i>Archips rosanus</i>)	In relazione all'eccezionalità dei danni, consultare i tecnici del Servizio assistenza alle coltivazioni per valutare l'opportunità dell'intervento	<i>Bacillus thuringiensis</i>			

Regione Emilia-Romagna 2025
(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) Numero massimo di interventi per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Afidi (<i>Hyalopterus amygdali</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i>)	Soglia 5% di getti infestati Si consiglia di localizzare il trattamento nelle sole aree infestate	<i>Beauveria bassiana</i>	(*)		(*) Ammesso su <i>Myzus persicae</i>
		Azadiractina			
		Sali potassici di acidi grassi			
		Piretrine pure	(*)	4*	(*) Ammesso su <i>Myzus persicae</i>
		Tau-fluvalinate	1*		(*) Al massimo 2 interventi nei limiti di 4 tra piretrine e piretroidi escluso etofenprox
		Acetamiprid	1		
		Pirimicarb	1		
		Spirotetramat	2*		Utilizzabile entro il 30/10/2025
Nematodi (<i>Meloidogyne</i> spp.)	L'albicocco è molto sensibile agli attacchi di nematodi galligeni nella fase di allevamento in vivaio. Si consiglia pertanto di acquistare piante certificate, di controllare lo stato fitosanitario delle radici e di evitare il ristoppio In presenza di nematodi galligeni si raccomanda di utilizzare come portinnesto il mirabolano da seme e sue selezioni				
Mosca delle frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	Soglia presenza di prime punture fertili Monitoraggio: si consiglia di monitorare settimanalmente la presenza degli adulti con trappole attrattive a partire da quanto indicato nei Bollettini territoriali; - alla comparsa delle prime catture controllare la presenza di punture fertili; porre particolare attenzione agli appezzamenti colpiti negli anni precedenti; in aziende frutticole miste monitorare la presenza della mosca seguendo la maturazione delle diverse specie. Interventi agronomici distruggere rapidamente la frutta non commerciale una volta terminata la raccolta	<i>Beauveria bassiana</i>			
		Proteine idrolizzate			
		Attract and kill con Deltametrina			
		Lambdacialotrina			
		Deltametrina	2	4*	(*) Tra piretrine e piretroidi escluso etofenprox
		Etofenprox	1*		(*) Al massimo 2 interventi indipendentemente dall'avversità
		Acetamiprid	1		
Forficule (<i>Forficula auricularia</i>)	I danni compaiono generalmente in prossimità della raccolta Interventi agronomici si consiglia di applicare colla (tipo plastilina liquida) a fine aprile, prima delle infestazioni, nelle aziende colpite negli anni precedenti				I trattamenti eseguiti con Spinosad, effettuati in questo periodo per la difesa da altre avversità, sono efficaci anche contro questo fitofago, se eseguiti nelle ore notturne, a cominciare da un'ora dopo la completa oscurità
		Lambdacialotrina	1	4*	(*) Tra piretrine e piretroidi escluso etofenprox
Capnode (<i>Capnodis tenebrionis</i>)	Interventi agronomici - si sconsigliano nuovi impianti di albicocco a sud della via Emilia in mancanza di impianto di irrigazione - garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi - evitare stress idrici e nutrizionali - accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia condizioni di asfissia per le radici - nei giovani impianti dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete metallica a maglia fitta per catturare gli adulti emergenti o prevenire la deposizione delle uova - specie nei giovani impianti l'uso della pacciamatura, con materiale biodegradabile per un raggio di circa 50 cm attorno al colletto della pianta, consente di ridurre i danni - scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare rapidamente la parte basale del tronco e le radici principali - in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente gli adulti Interventi chimici intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti				
		Nematodi entomopatogeni			
		Spinosad		3*	(*) Tra Spinetoram e Spinosad
		Deltametrina	2	4*	(*) Tra piretrine e piretroidi escluso etofenprox

Regione Emilia-Romagna 2025
(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) Numero massimo di interventi per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophyla suzukii</i>)	Interventi agronomici - si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di mela - si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti	Piretrine pure		4*	(*) Tra piretrine e piretroidi escluso etofenprox
		Deltametrina	2		
		Spinetoram	1*		(*) Tra Spinetoram e Spinosad al massimo 3 interventi all'anno (*) Utilizzabile fino al 30/12/2025
		Deltametrina	2		
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	Monitoraggio - a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc.) - eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle trebbiature delle colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti adiacenti che possono provocare massicci spostamenti della cimice <u>Monitoraggio visivo:</u> - controllare la presenza di adulti, ovature e forme giovanili, su foglie e frutti con particolare attenzione alla parte alta delle piante - nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile <u>Monitoraggio con trappole:</u> - utilizzare trappole specifiche con feromoni di aggregazione da ispezionare periodicamente - installare le trappole sui bordi dell'apezzamento, a distanza di almeno 20-30 m tra loro - le trappole all'interno dei frutteti possono comportare l'incremento delle popolazioni e dei danni nel raggio di azione del feromone (circa 6/8 metri) - le trappole non forniscono una stima della popolazione ma facilitano il rilievo della presenza dell'insetto - non esiste al momento una soglia d'intervento Mezzi fisici - applicare reti antinsetto monofila o monoblocco con chiusura, anticipando i primi spostamenti dell'insetto Interventi chimici - la situazione territoriale sulla presenza e diffusione della cimice è riportata nei Bollettini tecnici provinciali - gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri aziendali - l'effetto abbattente dei trattamenti è legato soprattutto all'azione diretta per contatto quindi gli interventi vanno correlati alla presenza dell'insetto				
		Sali potassici di acidi grassi			
		Piretrine pure		4*	(*) Tra piretrine e piretroidi escluso etofenprox
		Tau fluvalinate	2		
		Deltametrina	2		
		Etofenprox	2		
		Acetamiprid	1		
		Tebufenozide	2		
Cicaline (<i>Empoasca</i> spp.)	Interventi chimici infestazioni diffuse	Etofenprox	2		
Cydia (<i>Cydia molesta</i> = <i>Grapholita molesta</i>)	Si consiglia di installare entro il 15 luglio almeno 2 trappole per azienda con le caratteristiche riportate nella Tabella A Soglia presenza	Confusione sessuale			
		Virus della granulosi			
		Etofenprox	2		
		Emamectina	2		
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi chimici In presenza di infestazioni				
		Cyflumetofen	(*)		(*) Utilizzabile una volta ogni due anni
Cecidomia fiorale (<i>Contarinia pruniflorum</i>)	Controllare gli impianti che hanno avuto danni negli anni precedenti Per la difesa sfruttare l'efficacia collaterale degli insetticidi applicati su altre avversità in pre fioritura				
Limacce e Chioccioline (<i>Limax</i> spp., <i>Helix</i> spp.)		Fosfato ferrico			

Regione Emilia-Romagna 2025
(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) Numero massimo di interventi per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità