

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Peronospora (<i>Peronospora brassicae</i> , <i>Albugo candida</i>)	Interventi agronomici - adottare ampi avvicendamenti colturali - impiegare seme sano - allontanare le piante ammalate				
		Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
		Olio essenziale di arancio dolce			
		Mandipropamide	2*		(*) Per ciclo colturale
Alternariosi (<i>Alternaria raphani</i>)	Interventi chimici in caso di attacchi precoci				
Alternariosi (<i>Alternaria raphani</i>)	Interventi agronomici: - impiego di seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette				
		Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
		Fluxapyroxad (Fluxapyroxad+		2*	(*) Ammesso in pieno campo
		Difenconazolo)	1*		(*) Ammesso in pieno campo
		Azoxystrobin	2*		(*) Ammesso in pieno campo
Oidio (<i>Erysiphe cruciferarum</i>)	Interventi chimici in presenza di sintomi				
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	(*)		(*) Ammesso in pieno campo
FITOFAGI					
Altica (<i>Phyllotreta</i> spp.)	Interventi chimici intervenire In caso di infestazione generalizzata nelle prime ore del mattino				
		Deltametrina		2*	(*) Per i Piretroidi (*) Ammesso in pieno campo
Limacce e Chiocchie (<i>Limax</i> spp., <i>Helix</i> spp.)	Interventi chimici alla presenza				
		Fosfato ferrico			
Afidi	Interventi chimici intervenire in caso di infestazione generalizzata	Maltodestrina			
		Sali potassici di acidi grassi			
		Lambdacialotrina	1		(*) Per i Piretroidi
		Cipermetrina	1	2*	(*) Ammesso in pieno campo
		Deltametrina			
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> <i>Spodoptera</i> spp.)	Interventi chimici intervenire solo in caso di infestazione generalizzata				
		Lambdacialotrina	1	2*	(*) Per i Piretroidi
		Cipermetrina	1		(*) Ammesso in pieno campo
		Clorantraniliprole	2*		(*) Ammesso in pieno campo
Nematodi (<i>Heterodera schachtii</i>)	Interventi agronomici Il ravanello è una pianta ospite di <i>H. schachtii</i> e quindi non può essere coltivata in avvicendamento con la barbabietola da zucchero Utilizzare terreni esenti da <i>H. schachtii</i>				
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.)	Distribuzione localizzata ove sia stata accertata la presenza di larve secondo le modalità riportate nella Tabella 23 (Norme Generali) o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente				
		Teflutrin			

Regione Emilia-Romagna 2025
(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) Numero massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità