

Difesa integrata COLZA

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME (<i>Alternaria brassicae</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Peronospora parasitica</i>)	Interventi chimici In presenza di sintomi	Protioconazolo	2*		(*) Impiegabile su <i>Alternaria</i> e <i>Sclerotinia</i>
FITOFAGI Meligete (<i>Meligethes aeneus</i>)	Soglia 3 meligeti/pianta Intervenire prima dell'apertura dei fiori	Tau-fluvalinate Cipermetrina Acetamiprid	1 1*	2	
Afide (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	Soglia 2 colonie/mq	Sali potassici di acidi grassi Deltametrina Tau-fluvalinate Esfenvalerate Lambdacialotrina	1	2	
Altica Punteruolo Nottue	Soglia presenza accertata	Deltametrina Tau-fluvalinate Cipermetrina Lambdacialotrina Acetamiprid	1 (*) 1** 1*	2	(*) Impiegabile solo su altica (**) Tra Lambdacialotrina e Esfenvalerate (*) Impiegabile solo su altica
Limacee e chioccioline (<i>Limax spp.</i> , <i>Helix spp.</i>)	Indicazione d'intervento infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali	Fosfato ferrico			

Regione Emilia-Romagna 2025

(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità