

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pulizia dei letti di semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree
Diserbo argini e sponde dei bacini	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	Applicazioni ammesse solo sulla sponda adiacente ai bacini per limitare lo sviluppo delle infestanti dagli argini ai bacini stessi (1) Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l/ha
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone Florpyrauxifen-benzyl	
	Graminacee	Clethodim Propaquizafop	
Altre fasi	Riso crodo	Glifosate (1) Flufenacet	(1) Interventi soprachioma con prodotti specificatamente registrati
	Giavone	Clomazone Cyalofop-butile	
	Graminacee	Penoxsulam	
	Infestanti non Graminacee e Giavoni	Halosulfuron metile (*)	
	Giavone e altre infestanti	Imazamox (*) (2) Fluorpyrauxifen-benzyl	(2) Ammesso su tutte le varietà di riso ufficialmente certificate tolleranti agli erbicidi imidazolinoni (ad esempio Clearfield, Full Page, ecc.)
	Eterentera	Bensulfuron-metile Metsulfuron-metil (*)	
	Ciperacee Alismataceae Butomacee Eterentera	Bensulfuron-metile Triclopir (3)	(3) Impiegabile al massimo sul 50% della risaia
	Alismataceae Ciperacee Butomacee	MCPA	
Post-emergenza	Graminacee	Quizalofop-p-etile (4) Ciclossidim (5)	(4) Utilizzabile solo su varietà ed ibridi di riso tolleranti agli erbicidi inibitori dell'enzima ACCasi (5) Utilizzabile solo su varietà tolleranti (tecnologia provisia)

Imazamox e ciclossidim= ammessi solo sulle varietà che sono riportate in etichetta e presentano resistenza biologica al prodotto

(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero di ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione indicate in grassetto: 4

Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)