

DISERBO Frumento e Orzo FVG 2025 v1											
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive		
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	4 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di Glifosate si conteggia per ciascuna delle colture	Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.						
		Acido pelargonico									
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Flufenacet		Non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente		Il diserbo di pre-emergenza di frumento e orzo è consentito una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento. Tale pratica è alternativa al diserbo di post emergenza precoce					
		Pendimethalin		Non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente							
		Prosulfocarb									
		Diflufenican			Dicotiledonica con azione secondaria su graminacee						
	Graminacee	Triallate									
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Prosulfocarb		Non impiegabile su frumento se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente.		Dicotiledonica con azione secondaria su graminacee			Il diserbo di post emergenza precoce è alternativo a quello di pre emergenza		
		Flufenacet									
		Diflufenican									
		Beflubutamid									
	Dicotiledoni	Halauxifen-metile									
	Dicotiledoni	Tifensufuron metile									
		Metsulfuron metile									
		Tribenuron-metile									
		Mecoprop-P									
		Diclorprop-p									
		Tritosulfuron									
		Fluroxipir									
		Florasulam									
		Amidosulfuron									
		Aminopiralid									
		2,4 D									
			Ammesso un solo trattamento tra il post emergenza e il post raccolta.								

Controllo Integrato delle infestanti di: FVG DISERBO Frumento e Orzo_25

Post emergenza		MCPA	Impiego alternativo al diserbo di pre emergenza / post emergenza precoce.	Dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee												
		Diflufenican														
		Clopiralid														
		Halauxifen-metile														
	Graminacee e Dicotiledoni	Iodosulfuron metil-sodium														
		Thiencarbazone														
		Mesosulfuron-metile														
		Propoxycarbazone-sodium														
		Pyroxsulam														
		Bensulfuron metile														
	Graminacee	Fenoxaprop-p-etile							Non ammesso su orzo.							
		Pinoxaden							Non ammesso su orzo.							
		Diclofop-metile							Non ammesso su orzo.							
		Clodinafop							Non ammesso su orzo.							
	Post raccolta	Dicotiledoni							2,4 D	Ammesso un solo trattamento tra il post emergenza e il post raccolta						
		Graminacee e Dicotiledoni							Glifosate	Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di Glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.	Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.					
Acido pelargonico																