

FVG_DIFESA Barbabietola da zucchero 2025														
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	S.a non soggetta a lim. uso per avversità	Pieno campo	Coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Informazioni aggiuntive	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
CERCOSPORA SPP.	Cercospora beticola	Interventi chimici: - per l'inizio dei trattamenti seguire le indicazioni dei bollettini locali di assistenza tecnica o al raggiungimento delle prime confluenze delle macchie necrotiche sulle foglie.	Interventi agronomici: - scelta di cv resistenti o tolleranti.	Prodotti rameici	Si			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura	Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno con prodotti di sintesi. Ammessi 4 interventi per gli estirpi dopo il 31 agosto.
				Zolfo	Si			Inorganici	M					
				Bacillus subtilis	Si			Microbici Bacillus sp.	F6					
				Difenoconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1	1	3		Gli IBE sono efficaci anche contro il mal bianco. Si consiglia di impiegare i prodotti IBE in miscela con prodotti con diverso meccanismo d'azione. Si consiglia di non impiegare gli IBE da soli più di 1 volta all'anno. L'uso del Difenoconazolo è in alternativa al Metconazolo.	
				Tetraconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1				Gli IBE sono efficaci anche contro il mal bianco. Si consiglia di impiegare i prodotti IBE in miscela con prodotti con diverso meccanismo d'azione. Si consiglia di non impiegare gli IBE da soli più di 1 volta all'anno.	
				Metconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1	1			Impiegabile solo in miscela con protioconazolo. L'uso del Metconazolo è in alternativa al Difenoconazolo. Gli IBE sono efficaci anche contro il mal bianco. Si consiglia di impiegare i prodotti IBE in miscela con prodotti con diverso meccanismo d'azione. Si consiglia di non impiegare gli IBE da soli più di 1 volta all'anno.	
								Protioconazolo	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I					
				Fenpropidin				Ammine - morfoline IBE- Classe II	G2	1			Impiegabile solo in miscela con Metconazolo. Gli IBE sono efficaci anche contro il mal bianco. Si consiglia di impiegare i prodotti IBE in miscela con prodotti con diverso meccanismo d'azione. Si consiglia di non impiegare gli IBE da soli più di 1 volta all'anno.	
OIDIO DELLA BIETOLA	Erysiphe betae		Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	Si			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura	
				Zolfo	Si			Inorganici	M					
				Bacillus subtilis	Si			Microbici Bacillus sp.	F5					
				Difenoconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1	1				
RHIZOCTONIA SPP.	Rhizoctonia sp.		Interventi agronomici: - ampi avvicendamenti colturale (escludere dall'avvicendamento i prati da leguminose) - facilitare lo sgrondo delle acque - lavorazione del suolo per avere una buona struttura - corretta gestione dell'irrigazione.											
VIRUS DELLA RIZOMANIA		Interventi agronomici: - ricorrere a varietà tolleranti nei terreni rizomani.	Interventi agronomici: - lunghe rotazioni colturali.											
FITOFAGI														Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti, Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi .
ALTICA DELLA BARBABIETOLA	Chaetocnema tibialis	Soglia: - fori su foglie cotiledonari - 2 fori/foglia su piante con 2 foglie - 4 fori/foglia su piante con 4 foglie.		Tau-fluvalinate				Piretroidi e piretrine	3A					Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti, Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi .
				Etofenprox	Si			Piretroidi e piretrine	3A	1			Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina	
				Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3A	1			Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina	
				Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3A	1				
				Teflutrin				Piretroidi e piretrine	3A		1		Applicazione localizzata, in alternativa ad altri geodisinfestanti (lambdacialotrina)	
ATOMARIA DELLA BARBABIETOLA	Atomaria linearis		Temibile solo in casi di risemine.										Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti e Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi.	
ELATERIDI	Agriotes sp.	Soglia: - presenza accertata - soglia con i vasetti : 1 larva per trappola - con i carotaggi la soglia è di 15 larve/m².	Con infestazioni in atto per creare un ambiente sfavorevole alle larve eseguire sarchiature ripetute.	Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3A		1		Geodisinfestanti, applicazione localizzata.	Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti, Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi.
				Teflutrin				Piretroidi e piretrine	3A				Geodisinfestanti, applicazione localizzata.	

CLEONO DELLA BARBABIETOLA	Conorhynchus mendicus	Soglie: - erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle piante delle file più esterne, a partire dalla metà di aprile - superamento di 2 adulti per vaso/settimana.	Effettuare il primo trattamento sui bordi dell'appezzamento, poi intervenire a pieno campo contro gli adulti.	Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3A						Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti, Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi.
				Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3A	1				Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina	
				Tau-fluvalinate				Piretroidi e piretrine	3A						
LISSO	Lixus juncii		Interventi agronomici: - programmare una rotazione almeno quadriennale, specialmente in caso di gravi infestazioni nelle annate precedenti Interventi chimici: - intervenire alla comparsa degli adulti.	Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3A						
				Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3A	1				Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina	
NOTTUE FOGLIARI	Mamestra brassicae, Spodoptera exigua, Autographa gamma	Soglie: - 2-3 larve/pianta, con distruzione del 10% dell'apparato fogliare.		Bacillus thuringiensis	Si			Microorganismi							Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti e Bacillus thuringiensis
				Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3A				Con piretroidi al massimo 1 intervento contro questa avversità		
				Etofenprox				Piretroidi e piretrine	3A		1		Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina. Con piretroidi al massimo 1 intervento contro questa avversità		
				Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3A				Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina. Con piretroidi al massimo 1 intervento contro questa avversità		
				Tau-fluvalinate				Piretroidi e piretrine	3A						
AFIDE NERO DELLA FAVA	Aphis fabae	Soglie: - 30% delle piante con colonie in rapido accrescimento e con mancanza di ausiliari.		Sali potassici di acidi grassi	Si			Sali di potassio degli acidi grassi							Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti e Bacillus thuringiensis. Intervento ammesso solo nelle aree infestate e in assenza di coccinellidi.
				Tau-fluvalinate				Piretroidi e piretrine	3A						
				Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3A						
				Esfenvalerate				Piretroidi e piretrine	3A	1			Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina		
NOTTUE TERRICOLE	Agrotis spp.	Soglia: - 1-2 larve di terza o quarta età, o 1-2 piante danneggiate per mq fino allo stadio di 8-10 foglie.		Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3A						Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti, Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi.
CASSIDA DELLA BARBABIETOLA			Individuare i focolai iniziali all'interno e sui bordi dell'appezzamento.	Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3A						Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con geodisinfestanti, Bacillus thuringiensis e Sali potassici degli acidi grassi.
				Tau-fluvalinate				Piretroidi e piretrine	3A						
NEMATODE CISTIFORME DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Heterodera schachtii	Interventi agronomici: - effettuare rotazioni almeno quadriennali con cereali, soia, Liliaceae - nei terreni fortemente infestati integrare l'avvicendamento con colture intercalari di piante esca resistenti (cv Pegletta, Nemax, Emergo di Raphanus sativus o Sinapis alba) da realizzare: - in primavera nei terreni messi a riposo (set-aside) - in estate (dopo grano o orzo) - in febbraio-marzo seguite da una coltura primaverile-estiva (per es. soia, mais). Le colture di piante esca devono essere trinciate e poi interrate dopo circa 40 giorni dalla semina per evitare la deiescenza dei semi e favorire un inerbimento del terreno, o solamente trinciate per favorire un ricaccio della coltura nei terreni a riposo (set-aside) Nei terreni poco o moderatamente infestati (fino a 200-250 uova-larve per 100 g di terreno essiccato all'aria) coltivare cvs di Barbabietola da zucchero tolleranti al nematode.	Si sconsiglia di usare in rotazione crucifere (colza, ravizzone, ravanello da seme, cavolo) poichè suscettibili al nematode. Tale limitazione non è valida per cvs resistenti di Rafano oleifero e Senape bianca. Porre attenzione nelle successioni con pomodoro. Nelle zone a rischio in autunno si consiglia di effettuare preventivamente l'analisi del suolo. In caso di infestazioni pari o superiori a 4 cisti vitali con 100 uova-larve per 100 g di terreno essiccato all'aria, è sconsigliata la coltura in quanto ne viene compromessa la produzione.												

Tab. 1 - Lista varietale e sensibilità alla cercospora.

NOME VARIETA'	CS	CL
FIAMMETTA KWS	KWS	M
GIACOMINA KWS	KWS	M
DOLEROSA KWS	KWS	M
SMART ROSSADA KWS	KWS	M
BTS 1820 N	BETASEED	M
AMERIVA KWS	KWS	M
BILJANA KWS	KWS	M
BENVENUTA KWS	KWS	M
BTS 2095N	BETASEED	M
BTS 1715	BETASEED	M
ESSENZIA KWS	KWS	M
GREGORIA KWS	KWS	M
VIOLA KWS	KWS	M
BTS 1740	BETASEED	M
SMART MATERIA KWS	KWS	M
OTTAVIA KWS	KWS	M
BTS 6975 N	BETASEED	M
ORAZIA KWS	KWS	M
BTS 2815 N	BETASEED	MS
CAMELEON	SESVanderHave	MS
SMART EVITA KWS	KWS	MS
YUCATAN	SESVanderHave	MS
ARUM	SESVanderHave	MS
CAROLL	STRUBE	MS
BTS SMART 9775 N	BETASEED	MS

BTS 4825	BETASEED	S
VLAD	STRUBE	S
BALI	SESVanderHave	S
BOTTICELLI	STRUBE	S
FERRET	SESVanderHave	S
RAISON	STRUBE	S
FITIS	SESVanderHave	S
OCTOPUS	SESVanderHave	S
SMART BRIGA KWS	KWS	S
SMART PERLA KWS	KWS	S
Sparrow Smart	SESVANDERHAVE	S
Litchi	SESVANDERHAVE	S
HELSINKI	SESVANDERHAVE	S
BISON PLUS	SESVANDERHAVE	NT
MOHICAN	SESVanderHave	NT
SMART DJERBA KWS	KWS	NT
Ventus	DLF	NT
MORINGA	SESVANDERHAVE	NT
RHINOCEROS	SESVANDERHAVE	NT
SANDPIPER SMART	SESVanderHave	NT
SMART RENJA KWS	KWS	NT
MARINELLA KWS	KWS	NT
Manatee Smart	SESVanderHave	NT
ELISKA KWS	KWS	NT
BTS 555	BETASEED	NT
MARSUPIAL SMART	SESVanderHave	NT