



## DISERBO DELLE POMACEE

<i>Infestanti controllate</i>	<i>Criteri di intervento</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<p><b>Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo va localizzato in bande lungo la fila.</b>  <b>La superficie trattata non deve superare il 30% della superficie totale.</b>  <b>Non ammesse lavorazioni meccaniche nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione.</b></p>			
Graminacee e Dicotiledoni  post-emergenza infestanti	<p><b>AGRONOMICO:</b> -Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno.</p> <p><b>CHIMICO:</b> -Interventi localizzati sulle file, operando su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità. -Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.</p>	<p>Glifosate (1) (2)</p> <p>2,4 D (3)</p>	<p>(1) Max 9 litri/anno/ha di frutteto in riferimento a formulati con 360 g/litro. Il riferimento alla concentrazione di principio attivo di 360 g/litro nel prodotto commerciale significa che per formulazioni a differente concentrazione occorre adattare il dosaggio per rispettare il limite di sostanza attiva per ettaro.</p> <p>(2) Se si utilizza in miscela con erbicidi residuali, massimo 6 litri/ha/anno in riferimento a formulati con 360 g/litro.</p> <p>(3) Solo in miscela con Glifosate; impiegabile in alternativa a MCPA e per max 1 intervento.</p>
Dicotiledoni	Post-emergenza precoce infestanti	<p>Carfentrazone (1)</p> <p>Pyraflufen-etile</p> <p>Fluroxypir (2)</p> <p>MCPA (3)</p>	<p>(1) Per ogni intervento la dose è di 0,3 L/ha come erbicida e max 1 litri/ha come spollonante</p> <p>(2) Impiegabile su melo e pero, max 1 applicazione</p> <p>(3) Impiegabile in alternativa al 2,4D</p>
Spollonante		Acido pelargonico	
Graminacee	Da utilizzare in post-emergenza delle infestanti	<p>Quizalofop-p-etile</p> <p>Fluazifop-p-butile (1)</p> <p>Propaquizafop</p> <p>Ciclossidim</p> <p>Clethodim</p>	
Graminacee e Dicotiledoni  Residuali pre-emergenza infestanti	<p><b>AGRONOMICO:</b> -Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno.</p> <p><b>CHIMICO:</b> Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.</p>	<p><b>Oxifluorfen (1)</b></p> <p><b>Diflufenican (1)</b></p> <p><b>Pendimetalin (1)</b></p> <p><b>Propyzamide (1)</b></p> <p>Clomazone</p>	(1) 1 solo intervento all'anno in alternativa tra loro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

AGGIORNAMENTO 2025

## DISERBO DELLE POMACEE

<i>Infestanti controllate</i>	<i>Criteri di intervento</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Dicotiledoni  Residuali pre-emergenza infestanti		Isoxaben (1)	(1) Applicare da fine inverno sino a inizio fioritura.