

DISERBO ORTICOLE Carciofo 2025 v1									
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive
Pre trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Acido pelargonico	2 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate						
		Glifosate		Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.	Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.				
		Propyzamide		Solo contro Lolium spp.					
	Dicotiledoni	Bifenox							
Pre emergenza e pre trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Oxyfluorfen							
		Aclonifen							
		Propyzamide		Solo contro Lolium spp.					
Pre emergenza e pre ricaccio	Dicotiledoni	Pendimethalin							
Post trapianto	Graminacee	Clethodim							
		Propyzamide		Solo contro Lolium spp.					

DISERBO ORTICOLE Carciofo 2025 v1											
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive		
Post emergenza e post ricaccio	Dicotiledoni e Graminacee	Oxyfluorfen	Sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	Ammesso solo tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio. Impiegabile solo lungo le file							
		Metazaclor		Se utilizzato in post trapianto proteggere la coltura con opportuna schermatura; utilizzabile su chiazze di acetosella.							
		Aclonifen									
		Propyzamide		Solo contro Lolium spp.							
	Graminacee	Fluazifop-p-butile									
Post trapianto e post ricaccio	Dicotiledoni	Pyridate									
		Pyraflufen ethyle									
	Graminacee	Quizalofop-p-etile									
		Clethodim									
		Propyzamide		Solo contro Lolium spp.							
	Diserbo interfila	Graminacee e Dicotiledoni		Acido pelargonico							
Propyzamide				Solo contro Lolium spp.							