



DISERBO DELLA VITE

<i>Infestanti controllate</i>	<i>Criteri di intervento</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<p>Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo va localizzato in bande lungo la fila. La superficie effettivamente trattata non deve superare il 30% dell'area totale, salvo indicazioni più restrittive in etichetta.</p>			
Graminacee e Dicotiledoni post-emergenza infestanti	AGRONOMICO: -Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno. CHIMICO: -Interventi localizzati sulle file, operando su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità. -Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.	Glifosate (1) (2)	<p>(1) Max 9 litri/anno/ha di vigneto in riferimento a formulati con 360 g/L. Il riferimento alla concentrazione di principio attivo di 360 g/L nel prodotto commerciale significa che per formulazioni a differente concentrazione occorre adattare il dosaggio per rispettare il limite di sostanza attiva per ettaro.</p> <p>(2) Se si utilizza in miscela con erbicidi residuali, massimo 6 litri/ha/anno in riferimento a formulati con 360 g/L.</p>
		Acido pelargonico	<p>Utilizzabile anche come spollonante, al dosaggio consigliato di 6 – 8 litri in 150 – 200 litri d'acqua.</p>
Dicotiledoni	Post-emergenza precoce infestanti Attività fogliare anche come spollonante. Post-emergenza infestanti	Carfentrazone (1) (2) Pyraflufen-etile	<p>(1) Al massimo 0,3 l/ha per ciascun intervento come erbicida.</p> <p>(2) Come spollonante la dose è di 0,3 L diluiti in 80-100 litri di soluzione per km percorso.</p>
		MCPA puro (3)	<p>(3) Usare attrezzature schermate e ugelli antideriva, il prodotto non deve venire a contatto con foglie e grappoli, altezza minima della vegetazione della vite 70 cm da terra</p>



DISERBO DELLA VITE

<i>Infestanti controllate</i>	<i>Criteri di intervento</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Graminacee	Da utilizzare in post-emergenza delle infestanti	Cicloxidim Quizalofop P etile Fluazifop-p-butile Cletodim Propaquizafop	
Graminacee e Dicotiledoni Residuali pre-emergenza infestanti	AGRONOMICO: -Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno. CHIMICO: -Non ammessi interventi chimici nelle interfile; -Interventi localizzati sulle file, operando su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità. -Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.	Oxifluorfen (1) Pendimetalin (1) Propizamide (1) Diflufenican (1) (2) Flazasulfuron (3) Penoxsulam (4) Isoxaben (5) Clomazone	(1) Massimo 1 intervento all'anno in alternativa tra loro. (2) Da utilizzare durante il riposo vegetativo, fino a un mese dal germogliamento. (3) Impiegabile solo ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi. Da utilizzare in miscela con glifosate nel periodo inverno-inizio primavera. (4) Impiegabile dal 4 anno di impianto nel periodo da marzo a metà luglio. (5) Utilizzabile da fine inverno fino al germogliamento della vite in produzione. Solo contro Dicotiledoni.