

DISERBO ORTICOLE Lattuga 2025 v1									
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive
Pre semina e pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	<div>2</div> <div>Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi</div>						
		Glifosate		<div>Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree☒ Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari ☒ a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. ☒ Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. ☒ Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.</div>	<div>Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.</div>				
Pre emergenza e pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propyzamide		<div>Non usare sullo stesso appezzamento più di 2 volte all'anno. Attenzione alle colture in successione.</div>					
Pre trapianto	Dicotiledoni	Bifenox							
Pre trapianto e pre ricaccio	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimethalin							
Post trapianto	Graminacee	Propaquizafop							
		Ciclossidim							
		Quizalofop-p-etile							
		Fluazifop-p-butile							
	Graminacee e Dicotiledoni	Propyzamide		<div>Non usare sullo stesso appezzamento più di 2 volte all'anno. Attenzione alle colture in successione.</div>					