



DISERBO DEL MANDORLO

<i>Infestanti controllate</i>	<i>Criteri di intervento</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<p>Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo va localizzato in bande lungo la fila. La superficie trattata non deve superare il 30% della superficie totale.</p>			
<p>Graminacee e Dicotiledoni</p> <p>post-emergenza infestanti</p>	<p>AGRONOMICO: -Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno.</p> <p>CHIMICO: -Interventi localizzati sulle file, operando su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità. -Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.</p>	<p>Glifosate (1) (2)</p>	<p>(1) Max 9 litri/anno/ha di frutteto in riferimento a formulati con 360 g/L. Il riferimento alla concentrazione di principio attivo di 360 g/L nel prodotto commerciale significa che per formulazioni a differente concentrazione occorre adattare il dosaggio per rispettare il limite di sostanza attiva per ettaro.</p> <p>(2) Se si utilizza in miscela con erbicidi residuali, massimo 6 litri/ha/anno in riferimento a formulati con 360 g/L.</p>
<p>Graminacee</p>	<p>Da utilizzare in post-emergenza delle infestanti</p>	<p>Quizalofop-p-etile</p> <p>Propaquizafop</p> <p>Clethodim</p>	
<p>Graminacee e Dicotiledoni</p> <p>Residuali pre-emergenza infestanti</p>	<p>AGRONOMICO: -Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno.</p> <p>CHIMICO: Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.</p>	<p>Oxifluorfen (1)</p> <p>Diflufenican (1)</p> <p>Pendimetalin (1)</p> <p>Clomazone</p>	<p>(1) 1 solo intervento all'anno in alternativa tra loro.</p>
<p>Dicotiledoni</p> <p>Residuali pre-emergenza infestanti</p>		<p>Isoxaben</p>	