

DIFESA Cavoli a Foglia 2025 v1												
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	S.a. non sogg. alle limit. d'uso per avv.	Pieno campo	Coltura protetta	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Coeff. di ponderazione	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
PERONOSPORA DEL CAVOLO	<i>Peronospora parasitica</i>		Interventi agronomici: - effettuare ampie rotazioni - favorire il drenaggio del suolo - allontanare le piante e le foglie infette - distruggere i residui delle colture - non adottare alte densità d'impianto.	<i>Prodotti rameici</i>	Si						28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura. I prodotti rameici sono efficaci anche contro le Batteriosi	
				Azoxystrobin				2			Pieno Campo: verificare etichetta prodotto fitosanitario. Coltura protetta: verificare etichetta prodotto fitosanitario.	
MARCIUME BASALE	<i>Phoma lingam;</i> <i>Sclerotinia spp.;</i> <i>Rhizoctonia solani</i>		Interventi agronomici: - arieggiare le serre e i tunnel - effettuare ampie rotazioni - eliminare le piante ammalate - utilizzare varietà poco suscettibili. Interventi chimici: - intervenire durante le prime fasi vegetative.	<i>Coniothyrium minitans</i>	Si						Ammesso solo contro Sclerotinia	
				<i>Trichoderma asperellum</i>	Si							
				<i>Trichoderma harzianum</i>	Si							
				<i>Eugenolo</i>	Si						Ammesso solo contro Sclerotinia	
				<i>Geraniolo</i>	Si						Ammesso solo contro Sclerotinia	
				<i>Timolo</i>	Si						Ammesso solo contro Sclerotinia	
				<i>Bacillus subtilis</i>	Si							
MORIA DELLE PIANTINE	<i>Pythium sp.</i>			<i>Trichoderma asperellum</i>	Si							
				<i>Trichoderma harzianum</i>	Si							
MYCOSPHAERELLA SPP.	<i>Mycosphaerella brassicicola</i>			Azoxystrobin			No	2				
				Difenoconazolo				2				

DIFESA Cavoli a Foglia 2025 v1												
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	S.a. non sogg. alle limit. d'uso per avv.	Pieno campo	Coltura protetta	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Coeff. di ponderazione	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
ALTERNARIOSI DEL CAVOLO	<i>Alternaria brassicae</i>			<i>Prodotti rameici</i>	Si						28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura	
				Azoxystrobin			No	2				
				Difenoconazolo				2				
OIDIO DELLE CRUCIFERE	<i>Erysiphe cruciferarum</i>		Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	<i>Zolfo</i>	Si							
				Azoxystrobin			No	2				
AFIDI	<i>Myzus persicae;</i> <i>Brevicoryne brassicae</i>		Interventi agronomici: - distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta.	<i>Azadiractina</i>	Si			3				
				<i>Maltodestrina</i>	Si							
				<i>Sali potassici di acidi grassi</i>	Si	No					Non autorizzati su cavolo cinese	
				Deltametrina				2			Non autorizzato su cavolo cinese	
TRIPIDI				<i>Olio essenziale di arancio dolce</i>	Si			6				
ALTICA DEI CAVOLI	<i>Phyllotreta sp.</i>											
TENTREDINE DELLE CRUCIFERE	<i>Athalia rosae</i>		Interventi con piretroidi su altre avversità hanno un'attività anche su tentredine									
NOTTUE	<i>Agrotis ipsilon;</i> <i>Spodoptera littoralis;</i> <i>Plusia gamma;</i> <i>Helycoverpa armigera;</i>		Interventi chimici: - trattare alla comparsa dei primi danni.	<i>Azadiractina</i>	Si			3				
				<i>Bacillus thuringiensis</i>	Si							
				<i>Feromoni Spodoptera</i>	Si							
CAVOLAIA	<i>Pieris brassicae</i>		Interventi chimici: - trattare alla comparsa dei primi danni.	<i>Azadiractina</i>	Si			3				
				<i>Bacillus thuringiensis</i>	Si							
MOSCA DEL CAVOLO	<i>Delia radicum</i>		Eliminare le crucifere spontanee. Distruggere i residui delle colture di cavolo durante l'inverno. Controllare le ovodeposizioni con trappole-uova.	Lambda-cialotrina							Insetticida granulare per trattamenti localizzati sulla fila.	

DIFESA Cavoli a Foglia 2025 v1												
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	S.a. non sogg. alle limit. d'uso per avv.	Pieno campo	Coltura protetta	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Coeff. di ponderazione	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
LIMACCE			Interventi chimici: - trattare alla comparsa.	Fosfato ferrico	Si							
				Metaldeide esca							Distribuire le esche lungo le fasce interessate	