

DIFESA Kaki 2025 v1								
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
MACULATURA FOGLIARE	<i>Mycosphaerella sp.</i>		Interventi chimici - intervenire a partire da caduta petali in base alle piogge.	Pyraclostrobin	2			
CANCRO	<i>Phomopsis sp.</i>		Interventi agronomici: - taglio e bruciatura degli organi infetti.					
SESIA DEL RIBES E DEL KAKI	<i>Synanthedon tipuliformis</i>		Interventi agronomici: - rimuovere le parti corticali alterate ospitanti le larve e chiudere con paste cicatrizzanti. Interventi chimici: - in maggio giugno e agosto settembre intervenire con 10 - 15% di piante infestate.	Olio minerale				
				Nematodi entomopatogeni				
MOSCA DELLA FRUTTA	<i>Ceratitis capitata</i>	Interventi chimici: - trattare solo in presenza delle prime punture fertili.	Interventi chimici: - si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo (tipo Rebell) innescate con Trimedlure - in caso di catture controllare la presenza di punture.	Beauveria bassiana				Solo formulato con specifica esca pronta all'uso.
				Spinosad	5			
				Attract and kill con: Deltametrina				
				Etofenprox	2			
COCCINIGLIE		Soglia di intervento: - intervenire solo in caso di presenza diffusa.		Olio minerale				
				Sali potassici di acidi grassi				
				Spirotetramat	1			
ALEURODIDI				Sali potassici di acidi grassi				
METCALFA	<i>Metcalfa pruinosa</i>	Interventi chimici: - presenza.		Etofenprox	2			Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
LIMACCE E CHIOCCIOLE	<i>Limax spp. Helix spp.</i>		Distribuire in caso di infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali	Fosfato ferrico				