



DISERBO DEL KAKI

<i>Infestanti controllate</i>	<i>Criteri di intervento</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo va localizzato in bande lungo la fila. La superficie trattata non deve superare il 30% della superficie totale.			
Graminacee e Dicotiledoni post-emergenza infestanti	AGRONOMICO: -Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno. CHIMICO: -Interventi localizzati sulle file, operando su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità. L'uso di diserbanti può essere opportuno quando - Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%) - Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.	Glifosate (1) (2) (3) Acido pelargonico	(1) Max 9 litri/anno/ha di frutteto in riferimento a formulati con 360 g/L. Il riferimento alla concentrazione di principio attivo di 360 g/L nel prodotto commerciale significa che per formulazioni a differente concentrazione occorre adattare il dosaggio per rispettare il limite di sostanza attiva per ettaro. (2) Se si utilizza in miscela con erbicidi residuali, massimo 6 litri/ha/anno in riferimento a formulati con 360 g/L.
Graminacee	Da utilizzare in post-emergenza delle infestanti	Quizalofop-p-etile Clethodim	
Polloni e dicotiledoni	Da utilizzare in post-emergenza delle infestanti	Pyraflufen etile	