



DISERBO DELLE DRUPACEE

<i>Infestanti controllate</i>	<i>Criteri di intervento</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo va localizzato in bande lungo la fila. L'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie.			
Graminacee e Dicotiledoni post-emergenza infestanti	AGRONOMICO: -Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno. CHIMICO: -Interventi localizzati sulle file, operando su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità. -Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. L'uso di diserbanti può essere opportuno quando - Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%) - Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.	Glifosate (1) (2) (3)	(1) Max 9 litri/anno/ha di frutteto in riferimento a formulati con 360 g/L. Il riferimento alla concentrazione di principio attivo di 360 g/L nel prodotto commerciale significa che per formulazioni a differente concentrazione occorre adattare il dosaggio per rispettare il limite di sostanza attiva per ettaro. (2) Se si utilizza in miscela con erbicidi residuali, massimo 6 litri/ha/anno in riferimento a formulati con 360 g/L. (3) Effettuare il trattamento tra aprile e giugno su infestanti in attiva crescita (massimo 10 cm di altezza).



DISERBO DELLE DRUPACEE

<i>Infestanti controllate</i>	<i>Criteri di intervento</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Dicotiledoni	<p>Post-emergenza precoce infestanti</p> <p>Attività fogliare anche come spollonante.</p> <p>Post-emergenza infestanti</p>	<p>Carfentrazone (1) (2)</p> <p>Pyraflufen-etile</p> <p>Fluroxipir</p> <p>2,4-D</p>	<p>(1) Autorizzato solo su pesco e susino, al massimo 0,3 l/ha per ciascun intervento come erbicida.</p> <p>(2) Massimo 1 litro/ettaro come spollonante.</p>
Graminacee	Da utilizzare in post-emergenza delle infestanti	<p>Quizalofop-p-etile</p> <p>Fluazifop-p-butile (1)</p> <p>Propaquizafop</p> <p>Clethodim</p>	(1) Autorizzato solo su pesco, susino e ciliegio.
Graminacee e Dicotiledoni Residuali pre-emergenza infestanti	<p>AGRONOMICO:</p> <p>-Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno.</p>	<p>Oxifluorfen (1)</p> <p>Diflufenican (1)</p> <p>Pendimetalin (1)</p> <p>Clomazone</p>	(1) 1 solo intervento all'anno in alternativa tra loro.
Dicotiledoni Residuali pre-emergenza infestanti		Isoxaben (1)	(1) Applicare da fine inverno sino a inizio fioritura.