

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

DISERBO ORTICOLE Riso semina in acqua 2025 v1									
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive
Diserbo argini - sponde dei bacini	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimethalin		Applicazioni ammesse solo sulla sponda adiacente ai bacini per limitare lo sviluppo delle infestanti dagli argini ai bacini stessi		Applicazioni ammesse solo sulla sponda adiacente ai bacini per limitare lo sviluppo delle infestanti dagli argini ai bacini stessi Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha			
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone							
		Florpyrauxifen-benzyl		s.a. impiegabile per la falsa semina					
		Acido pelargonico		s.a. impiegabile per la falsa semina					
	Graminacee	Clethodim		s.a. impiegabile per la falsa semina					
		Ciclossidim		s.a. impiegabile per la falsa semina					
	Riso crodo	Ciclossidim		s.a. impiegabile per la falsa semina					
		Clethodim		s.a. impiegabile per la falsa semina					
		Propaquizafop		s.a. impiegabile per la falsa semina					
		Flufenacet							
	Alismatacee, Butomacee, Ciperacee e Eterantera	Florpyrauxifen-benzyl		s.a. impiegabile per la falsa semina					
		Bensulfuron metile							
		Metsulfuron metile							
		Ciclossidim		Utilizzabile solo per le varietà a tecnologia Provisia					

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

Altre fasi	Riso crodo	Imazamox	4 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	Impiego ammesso per tutte le varietà di riso ufficialmente certificate tolleranti agli erbicidi imidazolinoni (ad esempio Clearfield, Full Page, ecc.)."					
	Graminacee	Ciclossidim		Utilizzabile solo per le varietà a tecnologia Provisia					
		Clomazone							
		Cyalofof-butile							
		Florpyrauxifen-benzyl							
		Penoxsulam							
		Imazamox		Impiego ammesso per tutte le varietà di riso ufficialmente certificate tolleranti agli erbicidi imidazolinoni (ad esempio Clearfield, Full Page, ecc.)."					
	Alismatacee, Butomacee, Ciperacee e Eterantera	Triclopir		Impiegabile al massimo sul 50 % della risaia					
		Imazamox		Impiego ammesso per tutte le varietà di riso ufficialmente certificate tolleranti agli erbicidi imidazolinoni (ad esempio Clearfield, Full Page, ecc.)."					
		Halosulfuron-metile							
		Bensulfuron metile							
		Metsulfuron metile							

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

		MCPA							
		Florpyrauxifen-benzyl							
	Dicotiledoni	Bensulfuron metile							
		Clomazone							
		Florpyrauxifen-benzyl							
		Halosulfuron-metile							
		MCPA		In un anno al massimo 1,4 litri di formulato commerciale					
		Triclopir		Impiegabile al massimo sul 50 % della risaia					