

DISERBO ORTICOLE Mais 2025 v1									
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	4	Diserbo letti di semina.					
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Terbutilazina	Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina. Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza. Impiegabile una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.		Fare attenzione allo sviluppo di infestanti resistenti. Per il mais, a partire dal 2024, se previsti gli interventi erbicidi di pre-emergenza devono essere realizzati con la tecnica del diserbo localizzato sulla fila. In alternativa al diserbo localizzato sono ammessi gli interventi erbicidi di pre-emergenza al massimo sul 50% della SAU investita a mais			
		Pendimethalin							
		Isoxaflutole		Impiegabile solo in pre o post emergenza precoce. Interventi ammessi solo nelle aziende che negli anni precedenti hanno riscontrato la presenza di Abutilon.					
		Thiencarbazone methyl		Al massimo 1 intervento all'anno.					
		Pethoxamide							
		Aclonifen		Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata, soia					
		Clomazone							
		Flufenacet							
		Dimetenamide-P							
		Mesotrione							
		Sulcotrione							
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Terbutilazina		In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina. Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza. Impiegabile una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.		I trattamenti in post emergenza precoce sono alternativi a quelli in pre-emergenza.			
		Pendimethalin							
		Isoxaflutole		Impiegabile solo in pre o post emergenza precoce. Interventi ammessi solo nelle aziende che negli anni precedenti hanno riscontrato la presenza di Abutilon.					

Regione Toscana 2025 – Controllo integrato infestanti

		Dimetenamide-P							
		Thiencarbazone methyl		Al massimo 1 intervento all'anno.					
		<b>Tembotrione</b>							
		Clomazone							
		Mesotrione							
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron							
		<b>Nicosulfuron</b>							
		Terbutilazina		In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina. Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza. Impiegabile una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.					
		Mesotrione							
		<b>Tembotrione</b>							
		Foramsulfuron							
		Thiencarbazone methyl		Al massimo 1 intervento all'anno.					
		<b>Sulcotrione</b>							
	Dicotiledoni	Clopiralid							
		Tifensulfuron - metile							
		Dicamba							
		Fluroxipir							
		Florasulam							
		<b>Prosulfuron</b>		Ammissa 1 sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.					
		Piridate							
		2,4 D		Al massimo sul 10% della superficie aziendale investita a mais. In alternativa al MCPA					
	Dicotiledoni e Ciperacee	<b>Halosulfuron-metile</b>							
	Dicotiledoni perenni	MCPA		Al massimo sul 10% della superficie aziendale investita a mais. In alternativa al 2,4D					