

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

DISERBO ORTICOLE Orzo da seme 2025 v1										
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive	
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	4							
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Flufenacet		Non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente		Il diserbo di pre-emergenza di frumento e orzo è consentito una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento. Tale pratica è alternativa al diserbo di post emergenza precoce				
		Pendimethalin		Non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente						
		Prosulfocarb								
		Diflufenican			Dicotiledonica con azione secondaria su graminacee					
	Graminacee	Triallate								
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Prosulfocarb				Il diserbo di post emergenza precoce è alternativo a quello di pre emergenza				
		Flufenacet		Non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente.						
		Diflufenican			Dicotiledonica con azione secondaria su graminacee					
		Beflubutamid								
	Dicotiledoni	Halauxifen-metile								
		Metsulfuron metile		Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla						
		Tifensufuron metile								
		Tribenuron-metile								
		Mecoprop-P								

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

Post emergenza	Dicotiledoni	Diclorprop-p	sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi						
		Fluroxipir							
		Florasulam							
		Aminopirialid							
		2,4 D		Ammesso un solo trattamento tra il post emergenza e il post raccolta.					
		MCPA							
		Diflufenican		Impiego alternativo al diserbo di pre emergenza / post emergenza precoce.	Dicotiledonica con azione secondaria su graminacee				
		Clopiralid							
		Halauxifen-metile							
	Graminacee e Dicotiledoni	Iodosulfuron metil-sodium							
		Bensulfuron metile							
	Graminacee	Fenoxaprop-p-etile		Non efficace su Lolium					
		Pinoxaden							
		Diclofop-metile							
Post raccolta	Dicotiledoni	2,4 D		Ammesso un solo trattamento tra il post emergenza e il post raccolta					
	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico							