

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

DISERBO ARBOREE Nocciolo 2025 v1											
Impianto Attività	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note attività - vincoli	Note attività - consigli	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive	
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Fogliare (post emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Acido pelargonico	1 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi					Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila. La superficie massima diserbabile non deve superare il 30% della superficie totale della coltura.	L'uso di diserbanti può essere opportuno quando: - Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a metri 3,5- 4; - Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici. -vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%). Agronomico: operare con gli inerbimenti, sfalci e/o lavorazioni del terreno.		
	Graminacee	Quizalofop-p-etile									
		Propaquizafop									
		Fluazifop-p-butile									
		Clethodim									
		Dicotiledoni e polloni		Pyraflufen ethyle							
	Acido pelargonico			Solo come spollonante							
	Carfentrazone			Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 l/ha come spollonante							
	Dicotiledoni e Graminacee			Pendimethalin							
		Oxyfluorfen									
Diflufenican											
Clomazone											
PRODUZIONE Fogliare (post emergenza infestanti)	Dicotiledoni	2,4 D									