

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

| DISERBO ARBOREE Vite 2025 v1                                  |                            |                    |   |   |                                 |                         |                          |  |  |                         |
|---|----------------------------|--------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------|
| Impianto Attività   | Infestante                 | Sostanza attiva    | Num. max inter. con i c.a.s   | Note sostanza attiva - vincoli  | Note sostanza attiva - consigli | Note attività - vincoli | Note attività - consigli | Vincoli coltura  | Consigli coltura   | Informazioni aggiuntive |
| ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Fogliare (post emergenza infestanti) | Dicotiledoni e Graminacee  | Acido pelargonico  | 1<br>Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi | Utilizzabile anche come spollonante   |                                 |                         |                          |  | CONSIGLI: Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno.<br>L'uso di diserbanti può essere opportuno quando:<br>- vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m. 1,5 / 2;<br>- vi siano rischi di erosione (es. pendenze al 5%).<br>Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. |                         |
|   | Dicotiledoni e spollonante | Carfentrazone      |   | Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida. Come spollonante la dose è di 0,3 litri diluiti in 80 - 100 litri di soluzione per km percorso |                                 |                         |                          |  |  |                         |
|   |                            | Pyraflufen ethyle  |   |   |                                 |                         |                          |  |  |                         |
|   | Dicotiledoni               | MCPA               |   |   |                                 |                         |                          |  |  |                         |
|   | Graminacee                 | Ciclossidim        |   |   |                                 |                         |                          |  |  |                         |
|   |                            | Clethodim          |   |   |                                 |                         |                          |  |  |                         |
|   |                            | Quizalofop-p-etile |   |   |                                 |                         |                          |  |  |                         |
|   |                            | Propaquizafop      |   |   |                                 |                         |                          |  |  |                         |
|   |                            | Fluazifop-p-butile |   |   |                                 |                         |                          |  |  |                         |
| ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Residuale (pre emergenza infestanti) | Dicotiledoni e Graminacee  | Penoxsulam         |   | Impiegabile dal 4 anno nel periodo da marzo a metà luglio   |                                 |                         |                          | VINCOLI: Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila. La superficie massima diserbabile non deve superare il 30% della superficie totale della coltura. |  |                         |
|   |                            | Flazasulfuron      |   | Impiegabile solo ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi.  |                                 |                         |                          |  |  |                         |
|   |                            | Oxyfluorfen        |   |   |                                 |                         |                          |  |  |                         |
|   |                            | Pendimethalin      |   |   |                                 |                         |                          |  |  |                         |
|   |                            | Propyzamide        |   |   |                                 |                         |                          |  |  |                         |
|   |                            |                    |   |   |                                 |                         |                          |  |  |                         |

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

|  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |              | Di flufenican |  | Riposo vegetativo fino ad un mese dal germogliamento                         |  |  |  |  |  |  |
|  |              | Clomazone     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dicotiledoni | Isoxaben      |  | Da fine inverno o primavera fino al germogliamento della vite in produzione. |  |  |  |  |  |  |