

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

DISERBO ORTICOLE Cavoli a infiorescenza 2025 (Cavolfiore , Broccoli , Broccoli cinesi, Cime di rapa)												
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive			
Pre semina e pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	1 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi									
		Napropamide		Ammesso solo su cavolo cavolfiore								
		Pendimethalin		Ammesso in pre-trapianto								
Post emergenza e post trapianto	Dicotiledoni	Clopiralid		Solo cavolfiore								
		Piridate										
	Graminacee	Propaquizafop										
		Quizalofop-p-etile										
		Clethodim										
	Dicotiledoni e Graminacee	Metazaclor		Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento.								
Post trapianto diserbo interfila	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico			Applicare su infestanti in attiva crescita fino allo stadio di 8-10 foglie e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm. Distribuire con attrezzature protettive per evitare il contatto con le colture							