

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

| DISERBO ORTICOLE Finocchio 2025 v1 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|--|------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| Epoca | Infestante | Sostanza attiva | Num. max inter. con i c.a.s | Note sostanza attiva - vincoli | Note sostanza attiva - consigli | Note epoca | Vincoli coltura | Consigli coltura | Informazioni aggiuntive |
| Pre semina e pre trapianto | Dicotiledoni e Graminacee | Acido pelargonico | 2 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi | | | | | | |
| Pre trapianto e pre emergenza | Dicotiledoni | Aclonifen | | | | | | | |
| | Dicotiledoni e Graminacee | Pendimethalin | | Ammesso 1 solo trattamento, a prescindere dall'epoca | Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione | | | | |
| | | Clomazone | | Da utilizzare subito dopo la semina. | | | | | |
| Post trapianto | Dicotiledoni e Graminacee | Pendimethalin | | Ammesso 1 solo trattamento, a prescindere dall'epoca | Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione | | | | |
| | Graminacee | Propaquizafop | | | | | | | |
| | | Clethodim | | Intervenire nella fase fenologica della coltura tra 2 e 6 foglie | | | | | |
| | | Fluazifop-p-butile | | | | | | | |
| | Diserbo interfila | Graminacee e Dicotiledoni | | Acido pelargonico | | | | | |